

Афлубин (капли в нос) - инструкция по применению

Форма выпуска

Капли гомеопатические.

Состав

100 мл раствора капель гомеопатических содержит:

Активные вещества: горечавка желтая (*Gentiana*) D1 - 1 мл, аконит аптечный (*Aconitum*) D6 - 10 мл, бриония двудомная (*Bryonia*) D6 - 10 мл, железа фосфат (*Ferrum phosphoricum*) D12 - 10 мл, молочная кислота (*Acidum sarcosolacticum*) D12 - 10 мл, спирт этиловый 43% (по весу) — 59 мл.

Упаковка

20, 50, 100 мл во флаконах темного стекла с капельницей.

Фармакологическое действие

Афлубин - комплексный гомеопатический препарат. Оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное действие. Обладает противовирусной активностью. Способствует повышению активности неспецифических факторов местного иммунитета. Уменьшает интенсивность и длительность интоксикационного и катарального синдромов, нормализует функции слизистой оболочки дыхательных путей.

Показания

Афлубин, показания к применению

- лечение и профилактика (плановая и экстренная) гриппа, парагриппа и других ОРЗ с целью облегчения симптомов (в составе комплексной терапии);
- лечение воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы

Разовые дозы:

Взрослые и подростки - 10 капель (1 таблетка), дети 1-12 лет - 5 капель (1/2 таблетки), дети до 1 года - 1 капля.

При гриппе и ОРЗ (1-2 день заболевания) кратность приема составляет от 3 до 8 раз в сутки .
При гриппе и ОРЗ (дальнейшее лечение) кратность приема - 3 раза в сутки в течение 5-10 дней.

Для плановой профилактики гриппа в начале холодного времени года или за 1 мес до ежегодно ожидаемого пика заболеваемости кратность приема - 2 раза в сутки в течение 3х недель.

Для экстренной профилактики гриппа и ОРЗ сразу же после контакта с заболевшим или после сильного переохлаждения принимают - 2 раза в сутки в течение 2х дней.

Для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом кратность приема - 3-8 раз в сутки в начале лечения (1-2 день), в дальнейшем - 3 раза в сутки в течение 1 месяца.

Препарат принимают за 30 минут до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайной ложке воды или материнского молока.

Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на некоторое время.

Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

В начале заболевания, а также случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата по 8-10 капель каждые полчаса – час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Афлубин при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Побочные действия

Не зарегистрировано на настоящий момент.

Особые указания

Поскольку препарат содержит растительные природные компоненты, при хранении его может наблюдаться незначительное помутнение и ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Взаимодействие

Клинически значимое взаимодействие с другими ЛС не установлено.

Срок годности

5 лет.

Показания к применению

J06 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации, M25.5 Боль в суставе, M79.0 Ревматизм неуточненный, J11 Грипп, вирус не идентифицирован, M13.9 Артрит неуточненный

Условия хранения

В защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.