

Аллокин-альфа - инструкция по применению

Форма выпуска

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения.

Состав

1 ампула содержит Аллоферон 1мг.

Упаковка

1, 3, 5 или 10 ампул в упаковке.

Фармакологическое действие

Аллокин-альфа – противовирусное средство - олигопептид, по фармакологическому действию близок к интерферону альфа. Индуктор синтеза эндогенных интерферонов и активатор системы клеток-киллеров. Стимулирует распознавание и лизис дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами. Эффективен при инфекциях, вызываемых вирусами простого герпеса I и II типа, а также гепатита В и вирусами гриппа А и В. Не обладает общей токсичностью, аллергенным, мутагенным, канцерогенным, эмбриотоксическим действием и не влияет на репродуктивную функцию. Повышение концентрации интерферона отмечается через 2 ч после введения препарата; высокая концентрация сохраняется (2-2.5 раза выше обычного фонового) на протяжении 6-8 ч со снижением до исходных значений к концу суток. Повышенная функциональная активность NK-киллеров наблюдается в течение 7 дней после введения препарата.

Показания

Аллокин-альфа, показания к применению

Хроническая папилломавирусная инфекция, хронический рецидивирующий герпес 1 и 2 типов, в составе комплексной терапии среднетяжелой (желтушной) формы острого гепатита В.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность и период лактации; выраженные аутоиммунные заболевания; детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы

Аллокин-альфа вводят подкожно.

Стандартный курс лечения *инфекций, вызванных онкогенными типами вируса папилломы человека* ,включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 6 инъекций.Стандартный курс лечения *рецидива герпеса* включает инъекции препарата в дозе 1 мг через день, всего на курс 3 инъекции. При *среднетяжелых формах острого гепатита В* препарат вводят после верификации диагноза в дозе 1 мг 3 раза в неделю в течение 3-х недель (всего 9 инъекций). Для приготовления раствора для инъекций в качестве растворителя используют 1 мл 0,9 % раствора хлорида натрия.

Побочные действия

Возможно: слабость, головокружение, образование новых элементов герпетической сыпи.

Взаимодействие

При лечении хронического рецидивирующего генитального герпеса может назначаться в комбинации с ацикловиром.

При остром гепатите В препарат назначается на фоне общепринятой базисной терапии.

Срок годности

2 года.

Показания к применению

B97.7 Папилломавирусы, B34 Вирусная инфекция неуточненной локализации, B00.9

Герпетическая инфекция неуточненная, B16 Острый гепатит В

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте, при температуре 2 - 8°C.