

Алпизарин - инструкция по применению

Форма выпуска

Таблетки.

Состав

1 табл. содержит мангиферина 100 мг.

Упаковка

20 шт.

Фармакологическое действие

Алпизарин — противовирусный препарат, полученный из травы копеечника альпийского (*Hedysarum alpinum* L.), копеечника желтеющего (*Hedysarum flavescens* Rgl. et Schmalh.) семейства бобовых или технического мангиферина, получаемого из листьев манго (*Mangifera indica* L.), семейства сумаховых. Препарат обладает противовирусной активностью в отношении ДНК—содержащих вирусов (*Herpes simplex* I и II типа, *Varicella zoster*, ВИЧ, ЦМВ), которая обусловлена подавлением репродукции вирусов на ранних этапах их развития. Препарат обладает способностью индуцировать продукцию гамма—интерферона в клетках крови.

Алпизарин оказывает умеренное бактериостатическое действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших и микобактерий туберкулеза.

Показания

Алпизарин, показания к применению

- лечение инфекций кожи и слизистых оболочек, вызванных вирусами *Herpes simplex* I и II типа, как первичных, так и рецидивирующих;
- профилактика инфекций, вызываемых *Herpes simplex* I и II типа;
- инфекции, вызванные вирусами *Varicella zoster* (ветряная оспа, опоясывающий герпес);
- герпетическая экзема Капоши;
- дерматозы предположительно вирусного генеза (красный плоский лишай);
- бородавки, остроконечные кондиломы.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность.

Способ применения и дозы

Терапевтический эффект Алпизарина наиболее выражен при его назначении в начальном периоде заболевания или рецидива.

Таблетки принимают внутрь независимо от приема пищи. *Взрослым и детям старше 12 лет* назначают по 1-2 таб. 3-4 раза/сут; *детям 6-12 лет* по 1 таб. 2-3 раза/сут; *детям 1-6 лет* по 1/2-1 таб. 2-3 раза/сут.

Курс лечения — от 3-5 дней до 3-4 недель, в зависимости от формы и тяжести заболевания.

Побочные действия

Обычно препарат хорошо переносится.

При приеме алпизарина внутрь возможны:

- тошнота;
- рвота;
- диарея;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- аллергические кожные реакции.

Особые указания

В случае распространенных высыпаний, а также при наличии лихорадки, лимфаденопатии и других общих явлениях применяют препарат Алпизарин таблетки 100 мг в комплексе с препаратом Алпизарин мазь для наружного и местного применения 2 % и 5 %.

1 таблетка препарата содержит 0,1 г сахара молочного (лактозы) и 0,0475 г крахмала картофельного, что соответствует 0,01 ХЕ (хлебных единиц). Максимальная суточная доза препарата для детей от 3-х до 12-ти лет содержит 0,03 ХЕ; для детей старше 12-ти лет и взрослых - 0,08 ХЕ.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности или требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортом и работа с движущимися механизмами).

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано. Возникновение передозировки маловероятно.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

В прохладном защищенном от света месте.