

Гипорамин - инструкция по применению

Регистрационный номер:

P N002432/01-2003

Торговое название: Гипорамин

Гипорамин – сухой очищенный экстракт из листьев облепихи крушиновидной (*Hipporhae rhamnoides* L.) семейства лоховых (*Elaeagnaceae*), представляющий собой полифенольный комплекс галлоэллаготанинов, биологически активными компонентами которого являются гидролизуемые танины, имеющие общие структурные элементы в виде глюкозгаллоильного и гексагидроксифеноильного остатков.

Состав

В медицинской практике применяют:

- **Таблетки сублингвальные:** гипорамин экстракт сухой – 0,02 г, вспомогательные вещества (сахар-рафинад, какао порошок, ванилин, натрий карбоксиметилцеллюлоза, кальций стеариновокислый) – до получения таблетки массой 0,6 г.
- **Гипорамин лиофилизированный:** гипорамин лиофилизированный – 0,02 г.
- **Мазь гипораминовая:** гипорамин – 0,5 г, вспомогательные вещества (ванилин, вазелин, твин-80 медицинский, эмульгатор № 1, масло эвкалиптовое, нипагин), вода очищенная – до 100,0 г.
- **Суппозитории ректальные:** гипорамин – 0,05 г, масло вазелиновое, основа для получения суппозитория (твердый жир тип А) – достаточное количество для получения суппозитория массой от 2,2 до 2,6 г.
- **Суппозитории вагинальные:** гипорамин – 0,05 г, масло вазелиновое, основа для суппозитория (твердый жир тип А) – достаточное количество для получения суппозитория массой от 2,2 до 2,6 г.
- **Суппозитории для детей:** гипорамин – 0,03 г, масло вазелиновое, основа для суппозитория (твердый жир тип А) – достаточное количество для получения суппозитория массой от 1,2 до 1,4 г.

Описание

Таблетки сублингвальные двояковыпуклой формы с риской от светло-серого или светло-серого с розоватым оттенком до светло-коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями.

Мазь белого цвета с бледно-кремовым оттенком.

Суппозитории от светло-коричневого цвета с желтовато-сероватым оттенком до коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство.

Фармакологические свойства

Гипорамин обладает выраженной противовирусной активностью в отношении различных штаммов вирусов гриппа А и В, аденовирусов, парамиксовирусов, вирусов простого герпеса, опоясывающего лишая, цитомегаловирусов, респираторно-синцитиального вируса, вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Ингибирующий эффект гипорамин на репродукцию вирусов проявляется на ранних этапах их развития. В основе механизма действия гипорамин лежит ингибирующий эффект на вирусную нейраминидазу. Гипорамин индуцирует продукцию интерферона в клетках крови в опытах *in vitro* и повышает содержание интерферона в крови больных.

Препарат в опытах *in vitro* оказывает также умеренное антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, туберкулезных микобактерий, кандиды, некоторых мицелиальных грибов.

Гипорамин малотоксичен. Не обладает алергизирующими, мутагенными, тератогенными и канцерогенными свойствами, не оказывает влияния на иммунный статус организма.

Показания к применению

Гипорамин применяют у взрослых и детей (в возрасте от 2 месяцев и старше) в качестве лечебно-профилактического средства при гриппе (А и В), парагриппе, респираторно-синцитиальной, аденовирусной и других острых респираторных вирусных инфекциях; ангинах, протекающих на фоне острых респираторных вирусных заболеваний и сопровождающихся ринитами; при острых и рецидивирующих формах простого герпеса экстрагенитальной и генитальной локализации, при опоясывающем лишае, ветряной оспе и цитомегаловирусной инфекции и других инфекциях, вызванных чувствительными к препарату вирусами.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы

Гипорамин назначают в возможно ранние сроки заболевания. Наиболее высокий лечебный эффект достигается, при сочетании лекарственных форм гипорамин общерезорбтивного и местного действия.

При гриппозной, аденовирусной, респираторно-синцитиальной или другой вирусной инфекции верхних дыхательных путей назначают: сублингвальные таблетки по 0,02 г; суппозитории по 0,05 г (взрослым) и суппозитории по 0,03 г (детям);

лиофилизированный гипорамин 0,02 г, который используют в виде водного раствора, приготовляемого *ex tempore* путем добавления во флакон стерильной дистиллированной воды в объеме 10 мл (для получения 0,2% раствора) или 20 мл (для получения 0,1% раствора).

Сублингвальные таблетки используют для санации полости рта, для чего держат во рту до их полного рассасывания. При этом взрослым назначают по 1 таблетке 4-6 раз в день, детям старше 12 лет – по 1 таблетке 3-4 раза в день, детям от 3 до 12 лет – по 1/2-1 таблетке 2-4 раза в день, в зависимости от возраста. Детям младше трех лет

сублингвальные таблетки не применяют.

Суппозитории по 0,05 г для взрослых и по 0,03 г для детей назначают per rectum как лекарственную форму общерезорбтивного действия 1-2 раза в сутки в зависимости от тяжести процесса (наличие пневмонии, гипертермии и пр.). Детям младше 3 лет лечение суппозиториями проводят 1 раз в сутки без сублингвальных таблеток.

Ингаляционно гипорамин вводят с помощью различных ингаляционных аппаратов (У-1, УЗИ-70, АИ-1 и др.): взрослым – 0,2% водный раствор до 10 мл на ингаляцию; детям – 0,1% водный раствор: старшего возраста – до 10 мл на ингаляцию, детям младшего возраста – до 5 мл на ингаляцию.

При наличии ринита закапывают в каждый носовой ход взрослым 0,2% раствор 4-6 капель 3-4 раза в сутки, детям – 0,1% раствор от 2 до 4 капель (в зависимости от возраста) 2-3 раза в сутки.

Длительность лечения – при гриппе не менее 3 суток. При парагриппе, РС-вирусных, аденовирусных, микст-инфекциях и других ОРВИ – не менее 5 суток.

Для индивидуальной профилактики в период вспышки гриппа используют сублингвальные таблетки гипорамина, суппозитории per rectum и капли в нос по тем же схемам.

При ветряной оспе, опоясывающем лишае, герпесвирусной и цитомегаловирусной инфекциях, а также других вирусных поражениях кожных покровов и слизистых оболочек применяют: сублингвальные таблетки по 0,02 г; мазь 0,5%; суппозитории ректальные и вагинальные по 0,05 г (для взрослых); суппозитории по 0,03 г (для детей). Сублингвальные таблетки назначают взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 4-6 раз в сутки, детям 6-12 лет – по 1 таблетке 3-4 раза в сутки, детям 3-6 лет – по 1/2 таблетки 2-4 раза в сутки, детям младше 3 лет таблетки не назначают. Мазь 0,5% наносят на очаги поражения 4-6 раз в сутки. В качестве общерезорбтивного противовирусного средства одновременно при всех формах заболевания назначают суппозитории с гипораминном per rectum до 3 раз в сутки: взрослым – по 0,05 г и детям старше 3 лет – по 0,03 г. Детям младше 3 лет суппозитории по 0,03 г применяют 1 раз в сутки. При генитальном герпесе дополнительно вводят суппозитории интравагинально 1-2 раза в сутки: взрослым – по 0,05 г, детям – по 0,03 г.

Длительность применения зависит от тяжести процесса и составляет при легких формах заболевания 3-10 дней. При тяжелых и рецидивирующих формах заболевания минимальный курс лечения 2-3 недели. Целесообразны повторные курсы лечения. В условиях иммунодепрессивной терапии, у послеоперационных больных, в группах риска и др., гипорамин целесообразно применять для предупреждения развития вирусных осложнений. При этом для профилактики герпесвирусных заболеваний и ЦМВ-инфекции гипорамин применяют в виде сублингвальных таблеток по 0,02 г 3 раза в сутки и/или суппозитории per rectum 2 раза в сутки, в течение 5-7 суток.

Побочное действие

При длительном применении в дозах, превышающих указанные в инструкции, возможно повышение свертываемости крови.

Особые указания

1 таблетка содержит 0,5299 г сахара рафинада. Больным сахарным диабетом принимать после консультации с врачом.

Передозировка препаратом

При использовании препарата в виде сублингвальных таблеток, мази или суппозитория интоксикация не наблюдалась.

Применение водных растворов в концентрации выше 0,2% может вызвать раздражение слизистой оболочки полости носа.

Форма выпуска

☒ Таблетки сублингвальные по 0,02 г по 10, 20 или 30 таблеток в контурной ячейковой упаковке или по 25 таблеток в стеклянных банках, темного стекла.

☒ Лиофилизированный гипорамин по 0,02 г стерильный во флаконах.

☒ Мазь гипораминовая 0,5% по 10 и 20 г в банках и тубах.

☒ Суппозитории ректальные и вагинальные с гипорамином по 0,05 г в контурной ячейковой упаковке.

☒ Суппозитории с гипорамином по 0,03 г в контурной ячейковой упаковке. **Условия хранения**

Сублингвальные таблетки и лиофилизированный гипорамин хранят в сухом, защищенном от света месте, при температуре 15-25 °С.

Мазь и суппозитории – в прохладном, защищенном от света месте.

Хранят в местах, недоступных для детей. **Срок годности**

Срок годности 2 года. По истечении срока годности не используют. **Условия отпуска из аптек**

Отпускается без рецепта врача.

Производитель:

ГУП "Производственно-экспериментальный завод ВИЛАР"

(ГУП "ПЭЗ ВИЛАР"). 117216, Москва, ул. Грина, 7.