

# Иммунал таблетки - инструкция по применению

## Регистрационный номер

П N013458/02-071207

## Торговое название

Иммунал®

## Лекарственная форма

Таблетки

## Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки светло-коричневого цвета с вкраплениями с запахом ванили.

## Состав

1 таблетка содержит

*активное вещество:* эхинацеи пурпурной травы (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) сок высушенный - 80 мг;

*вспомогательные вещества:* кремния диоксид коллоидный, лактоза, магния стеарат, натрия сахаринат, ванилин, ароматизатор вишневый.

## Фармакотерапевтическая группа:

Иммуностимулирующее средство растительного происхождения.

**Код АТХ:** L03AX

## Фармакологические свойства

*Иммунал является иммуностимулирующим препаратом, изготовленным из лекарственного растительного сырья.*

Эхинацея пурпурная (*Echinacea purpurea* (L.) Moench) содержит активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действующие в качестве стимуляторов иммунитета. Повышая число лейкоцитов (гранулоцитов) и активизируя фагоцитоз, действующие вещества препарата подавляют размножение микроорганизмов в организме человека и способствуют уничтожению болезнетворных бактерий. Кроме того, установлено противовирусное действие травы эхинацеи пурпурной в отношении возбудителей гриппа и герпеса.

## Показания к применению

Иммунал® рекомендуется применять для укрепления иммунитета у пациентов с неосложненными острыми инфекционными заболеваниями, предрасположенностью

к частым простудам, для профилактики простудных заболеваний и гриппа, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при продолжительной антибиотикотерапии хронических инфекционных заболеваний, сопровождающихся снижением иммунитета.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата и растениям семейства сложноцветных;
- прогрессирующие системные и аутоиммунные заболевания, (такие как туберкулез, саркоидоз, коллагеноз, рассеянный склероз);
- иммунодефицит (СПИД или ВИЧ-инфекция) и иммуносупрессия (например, цитостатическая противоопухолевая терапия; трансплантация органов или костного мозга в анамнезе);
- заболевания крови (агранулоцитоз, лейкопения);
- аллергические заболевания (крапивница, атопический дерматит, бронхиальная астма);
- возраст до 12 лет (данных по эффективности недостаточно);
- беременность и период грудного вскармливания;
- непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

### **С осторожностью**

Пациенты с сахарным диабетом.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Данные по применению эхинацеи при беременности и в период грудного вскармливания ограничены, поэтому применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

### **Способ применения и дозы**

Применять внутрь независимо от приема пищи.

*Взрослым и подросткам старше 12 лет* по 1 таблетке 3-4 раза в день.

Для профилактики в период сезонных заболеваний и лечения простуды рекомендуется принимать препарат непрерывно в течение 10 дней.

Повторные курсы возможны по рекомендации врача после 14-дневного перерыва.

Для лечения прием препарата следует начинать при первых признаках простуды.

### **Побочное действие**

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нежелательные эффекты классифицированы в соответствии с их частотой развития следующим образом: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10000, <1/1000) и очень редко (<1/10000), включая отдельные сообщения, частота неизвестна (невозможно посчитать по имеющимся данным).

#### *Нарушения со стороны крови и лимфатической системы*

*частота неизвестна*: лейкопения (при непрерывном применении более 8 недель).

#### Нарушения со стороны иммунной системы

*частота неизвестна*: реакции повышенной чувствительности (кожная сыпь, зуд), ангионевротический отек, отек Квинке, синдром Стивенса-Джонсона, анафилактический шок.

Эхинацея может провоцировать аллергические реакции у пациентов с атонией.

Также сообщалось о взаимосвязи возникновения нежелательных явлений с аутоиммунными заболеваниями (диффузный энцефалит, узловатая эритема, иммунотромбоцитопения, синдром Эванса, синдром Шегрена с дисфункцией почечных канальцев).

#### Нарушения со стороны сердечнососудистой системы

*частота неизвестна*: головокружение, снижение артериального давления.

#### Нарушения со стороны дыхательной системы и органов грудной клетки

*частота неизвестна*: бронхоспазм с обструкцией и приступы бронхиальной астмы как проявления реакций повышенной чувствительности.

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

### **Передозировка**

Симптомы интоксикации вследствие передозировки препарата не отмечены.

### **Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

При одновременном приеме с иммунодепрессантами – взаимное ослабление действия. Сообщения о каком-либо клинически значимом взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют.

### **Особые указания**

В случае возникновения побочных эффектов следует прекратить прием препарата Иммунал® и обратиться к врачу.

При ухудшении состояния или появлении высокой температуры на фоне применения препарата, или сохранении симптомов заболевания более 10 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Данных об отрицательном влиянии препарата Иммунал® в рекомендуемых дозах на способность управлять транспортными средствами, механизмами нет.

### **Форма выпуска**

Таблетки, по 10 или 20 таблеток в блистере, по 2, 3 или 4 блистера (по 10 таблеток) или 1, 2 или 3 блистера (по 20 таблеток) вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной пачке.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25° С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.  
Не использовать препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

Сандоз д.д., Веровшкова 57, 1000 Любляна, Словения  
Произведено: Лек д.д., Словения  
*Претензии потребителей направлять в ЗАО «Сандоз»:*  
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 3