

Оциллококцинум гранулы - инструкция по применению

Регистрационный номер П N014236/01

Торговое название препарата

Оциллококцинум®

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические

Состав (на одну дозу):

Активные компоненты:

Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum (анас барбариаелиум, гепатик эт кордис экстрактум) 200 К – 0,01мл

Вспомогательные компоненты:

Сахароза - 850 мг

Лактоза - 150 мг

Описание

Белые гранулы почти сферической формы, без запаха, легко растворимые в воде.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Показания к применению

Грипп легкой и средней степени тяжести, острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата.

Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат применяется по назначению врача.

Способ применения и дозы

Положить под язык содержимое тубы и держать до полного растворения.

Для детей: растворить содержимое тубы в небольшом количестве воды и давать с ложечки или с помощью бутылочки с соской.

Принимать препарат за 15 мин до приема пищи или час спустя.

Дозировка зависит от стадии заболевания и не зависит от возраста пациента.

Для профилактики: принимать по 1 дозе 1 раз в неделю в период распространения ОРВИ.

Начальная стадия заболевания: как можно раньше принять 1 дозу, затем при необходимости повторить прием 2-3 раза с интервалом в 6 часов.

Выраженная стадия заболевания: принимать по 1 дозе утром и вечером в течение 1-3 дней.

Побочное действие

На настоящий момент информация о побочных действиях препарата отсутствует. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, то следует обратиться к врачу.

Препарат действует тем быстрее и эффективнее, чем раньше начато лечение - с первых же симптомов заболевания.

Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Гранулы гомеопатические. По 1 дозе (1 грамму) гранул в тубе из белого полипропилена с пробкой из полиэтилена. По 3 тубы в блистер из прозрачной полихлорвиниловой термоклейкой пленки, запечатанной бумажной лентой. По 2, 4 или 10 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку с заклеивающимся по бокам "язычком".

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C
Хранить в недоступном для детей месте.




Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача



Производитель

БУАРОН,

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Адрес места производства

20, ул. Либерасьон, 69110 Сент-Фуа-ле-Лион, Франция

2, авеню де л`Уэст Лионнэ, 69510 Мессими, Франция

Представитель в России/организация, принимающая претензии потребителей
ООО «Буарон», Москва,
ул. Долгоруковская, д. 7
Тел.: (495) 956 08 10,
факс: (495) 956 08 14